

Anormalidades comuns na RMI cerebral e da coluna observadas em pacientes com MPS ⁴

	MPS I-H	MPS I-H/S	MPS I-S	MPS II	MPS IIIA	MPS IIIB	MPS IIIC	MPS IIID	MPS IVA	MPS IVB	MPS VI	MPS VII	MPS VII
Alterações de sinal	+++	++	++	+++	++	++	—	+	±	±	+	++	—
Aumento de PVS	+++	++	++	+++	++	++	—		—	—	++	—	—
Hidrocefalia/ ventriculomegalia	+++	++	++	+++	++	+	—	±	±	—	+	—	—
Atrofia	++	+	+	+++	+	+++	—	+	—	—	+	—	—
Estenose da coluna	++	++	++	+	+	—	—	—	+++	+++	+++	+	—

+++ Constante ++ Frequente + Menos frequente ± Rara — Não descrito na literatura, no nosso conhecimento

Adaptado de Zafeiriou *Am J Neuroradiol* 2013.

Abreviações: MPS, mucopolissacaridose; MPS I-H, Síndrome de Hurler; MPS I-H/S, Síndrome de Hurler-Scheie; MPS I-S, Síndrome de Scheie; RMI, ressonância magnética por imagem; PVS, espaço perivascular