

Principais manifestações musculoesqueléticas da MPS por tipo de distúrbio⁸

Distúrbio	Manifestações musculoesqueléticas
MPS I /Síndrome de Hurler	Disostose múltipla, baixa estatura desproporcional, contraturas articulares, CTS, hipoplasia odontoide, instabilidade atlanto axial, displasia acetabular, coxa valga, geno valgo, dedos em gatilho
MPS I /Hurler–Scheie, Scheie	Manifestações mais leves de síndrome de Hurler
MPS II/Hunter	Disostose múltipla, baixa estatura desproporcional, contraturas articulares, CTS, hipoplasia odontoide, instabilidade atlanto axial, displasia acetabular, coxa valga, geno valgo, dedos em gatilho
MPS III/Sanfilippo	Apenas manifestações somáticas leves, baixa estatura leve e contraturas em uma pequena proporção (principalmente na articulação do cotovelo)
MPS IVA/Morquio A	Displasia esquelética grave, disostose múltipla, baixa estatura desproporcional, hipermobilidade articular, hipoplasia odontoide, instabilidade atlanto axial, displasia acetabular, deslocamento do quadril, coxa valga, geno valgo, pés planos, pectus carinatum
MPS VI/Maroteaux–Lamy	Disostose múltipla, baixa estatura desproporcional, contraturas articulares, CTS, hipoplasia odontoide, instabilidade atlanto axial, displasia acetabular, coxa valga, geno valgo, dedos em gatilho, pectus carinatum
MPS VII/Sly	Disostose múltipla, baixa estatura desproporcional, contraturas articulares, hipoplasia odontoide, instabilidade atlanto axial, displasia acetabular, pectus carinatum
MPS IX/deficiência de hialuronidase	Baixa estatura, massas no tecido mole periarticulares, massas no cisto sinovial, efusões articulares, erosões acetabulares

Adaptado de Morishita, *Rheumatology*, 2011.

Abreviações: CTS, síndrome do túnel do carpo; MPS, mucopolissacaridose.